

灰色かび病、うどんこ病を
しっかり予防!

微生物殺菌剤

ボトキラー
水和剤

トマト灰色かび病

ナス灰色かび病

コチョウラン灰色かび病

きゅうり灰色かび病

ガーベラ灰色かび病

自動ダクト内投入機
きつつき君
SA-200

自動的に
ボトキラーを
ダクト内投入
します!

これならカンタン!
なるほどベンリ!


ハウスおすすめ省力散布法

少量のボトキラー水和剤を粉のまま、暖房機の送風用ダクトの風を利用してハウス全体に飛散・循環させる散布法です。

⚠ 暖房機の吸気口からは絶対に投入しないでください。
暖房機の故障の原因となることがあります。

水を使わず、製品をそのままダクトへ投入するだけ。毎日、少量ずつ継続することで、つねに灰色かび病が出にくいハウスを維持できます。

灰色かび病が出にくい
ハウスにする
ダクト内投入



きつつき君SA-200の
設置方法の動画はコチラ



ボトキラー水和剤

有効成分：バチルス スズチリス芽胞 1×10^{11} cfu/g 性状：類白色水和性粉末
農林水産省登録 第20080号

※使用回数は特に定めない

適用病害と使用方法

2025年7月末現在

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	使用回数	使用方法
野菜類	灰色かび病	1000倍	150～300ℓ/10a	発病前～発病初期	—※	散布
	うどんこ病					
ぶどう	灰色かび病		200～700ℓ/10a	開花期～幼果期		
かんきつ マンゴー						
なし				黒星病		
稲	いもち病					

作物名	適用病害虫名	使用量	使用時期	使用回数	使用方法
野菜類 (トマトを除く)	うどんこ病	15g/10a/日	発病前～発病初期	—※	ダクト内投入
	灰色かび病	10～15g/10a/日			
トマト	うどんこ病	15g/10a/日			
	灰色かび病	7.5g～15g/10a/日			
マンゴー		10g/10a/日			
かんきつ・ぶどう		15g/10a/日			
花き類・観葉植物		10～15g/10a/日			

作物名	適用病害虫名	使用量	使用液量	使用時期	使用回数	使用方法
野菜類	灰色かび病	300g/10a	6～10ℓ/10a	発病前～発病初期	—※	常温煙霧


ボトキラー水和剤の特徴

- ✓ 有効成分(バチルス菌)は自然界に存在する微生物です。
- ✓ 薬剤耐性菌に対しても予防効果を発揮します。
- ✓ 使用回数に制限がありません。
- ✓ マルハナバチ・ミツバチ及び天敵昆虫に影響が小さい剤です。
- ✓ ダクト内投入の登録を有しており、作業の省力化に貢献できます。




■なす葉面上での定着(電子顕微鏡写真×5,000倍)

ボトキラー水和剤を使用しない場合



ボトキラー水和剤を予め散布した場合



ボトキラー水和剤を散布すると、バチルス菌が植物体上で定着・増殖。病原菌の侵入を許しません。

■包装：100g×50袋/ケース 500g×10袋/ケース

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●使用後の空袋は圃場等に放置せず適切に処理してください。

●本製品に関するお問い合わせは

製造



株式会社 エイサー バイオテック

販売



アグロ カネショウ株式会社