



レターデン水和剤

農林水産省登録 第20264号

1/2

平成20年8月27日現在

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジフルベンスロンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	チャノキイロアザミウマ チャノホコリダニ	2000倍	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内
	ミカンサビダニ ミカンハモグリガ	2000~3000倍				





効果・薬害等の注意

- 本剤は主に脱皮阻害により殺虫効果を発揮する薬剤であるため、幼虫発生初期からの散布が望ましい。
- 蚕に対して強い影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 本剤の使用に当っては、使用時期を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合には病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 水溶性フィルム包装の場合、内袋はぬれた手で触れない。内袋はそのまま所定量の水に投入する。外袋の開封後は使い切ることが望ましい。やむを得ず保管する場合には、できるだけ速やかに使い切る。

安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないように注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、医師の手当を受ける。

治療法…該当なし

魚毒性等…本剤は水産動物、特に甲殻類に影響を及ぼすので養殖池等周辺での使用には十分注意する。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所。水溶性包装の場合、吸湿性があるので湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を固く閉じて保管する。

- PRTR法
- 火災時は適切な保護具を着用し水・消火剤等で消火に努める。
 - 漏出時は、保護具を着用し掃き取り回収する。
 - 移送取扱いは、ていねいに行う。
 - 空袋は圃場などに放置せず適切に処理する。

