



エコマイト顆粒水和剤

農林水産省登録 第21098号

1/2

令和6年3月13日現在

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロジクロフェンを含む農薬の総使用回数
りんご	ハダニ類	2000倍	200~700ℓ/10a	収穫前日まで	1回	散布	1回
おうとう				収穫14日前まで			
なし				収穫前日まで			
ぶどう							



アグロ カネショウ株式会社

<https://www.agrokanesho.co.jp/>



⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- おうとうの新梢伸長期の散布は薬害を生じるおそれがあるのでさける。
- ぶどうに使用する場合、果実に汚れが生じるおそれがあるので注意する。
- はくさいには薬害を起こすおそれがあるので、かからないように注意する。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

⚠ 安全使用上の注意



- 誤飲、誤食などのないように注意する。誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の手当を受けさせる。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので、眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼する。
- かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意する。

治 療 法…該当なし

魚毒性等…該当なし

保 管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所。

