



ダニエモンフロアブル

農林水産省登録 第21097号

1/2

令和3年6月16日現在

適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	スピロジクロフェンを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンハダニ ミカンサビダニ	4000~6000倍	200~700ℓ/10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回
	サビダニ類(ミカンサビダニを除く) チャノホコリダニ ミカンキジラミ	4000倍					
びわ	ビワサビダニ	2000倍	200~400ℓ/10a	収穫21日前まで			
さんしょう(果実)	ミカンハダニ			摘採14日前まで			
茶	チャノナガサビダニ	2000倍	200~400ℓ/10a	摘採14日前まで			



アグロ カネショウ株式会社

<https://www.agrokanesho.co.jp/>



効果・薬害等の注意

- 本剤は貯蔵中に分離することがあるので、使用に際しては容器をよく振る。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- ミカンキジラミの防除に使用する場合は、成虫には効果が劣るので、幼虫防除を対象とした散布を行う。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意する。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意



- 誤飲などのないように注意する。誤って飲み込んだ場合には、直ちに医師の手当を受けさせる。
- 散布の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをする。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

治 療 法…該当なし

魚毒性等…該当なし

保 管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所。

