



アフエットフロアブル

農林水産省登録 第22209号

1/5

令和7年1月29日現在

適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使 回 用 数	使 用 方 法	ベンチオピラト を含む農薬の 総使用回数	
つるな	菌核病	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回 以内	散布	3回 以内	
はなやさい類	菌核病 黒すす病 根朽病							
はくさい	黒斑病 白斑病 尻腐病 菌核病							
レタス 非結球レタス	灰色かび病 菌核病 すそ枯病 白絹病							
エンダイブ	すそ枯病			収穫 7 日前まで				
しゅんぎく	葉枯病							
キャベツ	菌核病 株腐病 根朽病 灰色かび病			収穫前日まで				
きゅうり	灰色かび病 菌核病 うどんこ病							
メロン	つる枯病							
	うどんこ病	2000～4000倍						
すいか	菌核病 うどんこ病 つる枯病	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回 以内	散布		
かぼちゃ	うどんこ病 つる枯病							
ズッキーニ にがうり	うどんこ病							
トマト	すすかび病 灰色かび病 菌核病 葉かび病							
	うどんこ病	2000～4000倍						
ミニトマト	すすかび病 灰色かび病 菌核病 斑点病 葉かび病	2000倍						
ししとう	灰色かび病 うどんこ病 黒枯病 斑点病							
ピーマン	灰色かび病 黒枯病 斑点病							
	白絹病						1ℓ/株	株元 灌注
	うどんこ病						2000～4000倍	100～300ℓ/10a



アグロ カネショウ株式会社

<https://www.agrokanesho.co.jp/>



適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用流量	使用時期	本剤の 使用 回数	使 用 法	ベンチオピラド を含む農薬の 総使用回数
なす	灰色かび病 菌核病 褐色斑点病 すすかび病 うどんこ病 褐色円星病	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3回 以内	散布	3回 以内
オクラ	灰色かび病 うどんこ病			収穫7日前まで	3回 以内		
いちご	輪斑病 黒色根腐病						
未成熟 とうもろこし	紋枯病						
にんじん	白絹病 菌核病 斑点病 うどんこ病 黒葉枯病	1000～2000倍	0.5～1ℓ/㎡	収穫前日まで	2回 以内	株元 灌注	3回 以内
にら	白斑葉枯病 さび病 褐色葉枯病						2回 以内
にら(花莖)	白斑葉枯病 さび病 白絹病	2000倍	100～300ℓ/10a	3回 以内	散布	4回以内 (種球塗沫は1 回以内、散布 は3回以内)	
にんにく	さび病 葉枯病						
	黒腐菌核病	原液	種球重量の 0.5～1.0%	植付前	1回	種球 塗沫	4回以内 (株元灌注は 2回以内、散 布及び無人 航空機散布 は合計2回 以内)
ねぎ	白絹病 黒腐菌核病	1000～2000倍	1ℓ/㎡	生育期 但し、 収穫14日前まで	2回 以内	株元 灌注	
	白絹病 葉枯病 さび病 黒斑病 小菌核腐敗病 小菌核病						
たまねぎ	灰色かび病 灰色腐敗病 小菌核病 黒腐菌核病	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	4回 以内	散布	4回 以内
アスパラガス	褐斑病 斑点病 茎枯病						
セルリー	斑点病 菌核病			3回 以内			3回 以内
とうき	苗立枯病	500～1000倍	セル成型育苗トレイ1 箱またはペーパーポット 1冊(30×60cm・使用 土壌約1.5～4.0ℓ)当り 0.2ℓ	育苗期	5回 以内	灌注	5回 以内
しそ	灰色かび病	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫3日前まで	2回 以内	散布	2回 以内
しそ(花穂)	斑点病			収穫前日まで			
パセリ	うどんこ病			収穫3日前まで			





適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使 回 用 数	使 用 方 法	ベンチオピラド を含む農薬の 総使用回数
し ょ う が	白星病	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日まで	3 回 以内	散布	3 回 以内
ら っ か せ い	白絹病 灰色かび病 菌核病 さび病 褐斑病						
いんげんまめ さやいんげん	角斑病						
豆 類 (種実、ただし、 だいず、らっか せい、いんげん まめを除く)	灰色かび病 菌核病 さび病						
豆 類 (未成熟、ただし、 えだまめ、さやい んげんを除く)							
だ い ず え だ ま め	うどんこ病						
小 粒 核 果 類 も ネ ク タ リ ン	灰星病 黒星病		200～700ℓ/10a				
お う と う	灰星病 幼果菌核病						
な し	黒星病 赤星病 うどんこ病						
り ん ご	黒星病 赤星病 うどんこ病 斑点落葉病 モニリア病 黒点病 褐斑病 すす斑病 すす点病						
か き	落葉病						
か ん き つ	灰色かび病 そうか病						
ぶ ど う	灰色かび病 晚腐病 黒とう病 うどんこ病 褐斑病 さび病			収穫 7 日前まで			
チューリップ	褐色斑点病 灰色かび病 うどんこ病		100～300ℓ/10a	発病初期			
き く	白さび病 灰色かび病 うどんこ病 黒さび病						





適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使 用 法	ベンチオピラトを含む農薬の 総使用回数
ゆ り	葉枯病 灰色かび病 うどんこ病	2000倍	100～300ℓ/10a	発病初期	3回 以内	散布	3回 以内
りんどう	灰色かび病 うどんこ病 花腐菌核病 褐斑病 黒斑病						
花き類・観葉植物 (きく、ゆり、チューリップ、りんどうを除く)	灰色かび病 うどんこ病						
食用ぎく	灰色かび病 白さび病 うどんこ病			収穫7日前まで	2回 以内		2回 以内
食用さくら (葉)	うどんこ病 せん孔褐斑病		200～700ℓ/10a		3回 以内		3回 以内
てんさい	根腐病	200～400倍	ペーパーポット1冊 当り1ℓ(3ℓ/m ²)	移植前	1回	苗床 灌注	4回以内 (苗床灌注 は1回以内、 散布は3回 以内)
	葉腐病	2000倍	100～300ℓ/10a	収穫7日前まで	3回 以内	散布	
小麦	赤さび病		60～150ℓ/10a	収穫14日前まで			3回 以内
とりかぶと (薬用)	白絹病	1000倍	1ℓ/m ²	生育期		株元 灌注	
どくだみ		2000倍	1～3ℓ/m ²	生育期 但し、 収穫14日前まで	2回 以内		灌注
たばこ	菌核病		100～180ℓ/10a	収穫10日前まで	3回 以内	散布	
あじさい	うどんこ病		200～400ℓ/10a	発病前～ 発病初期			

常温煙霧法

作物名	適用場所	適用病害名	使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用方法	ベンチオピラド を含む農薬の 総使用回数
きゅうり	温室、ガラス 室、ビニール ハウス等の密 閉できる場所	うどんこ病	150g/10a	10ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	常温煙霧	3回以内
なす		すすかび病						





⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 使用前によく振ってから使用する。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用する。
- 空容器は圃場などに放置せず、適切に処理する。
- ぶどうの幼果期（小豆大）以降の散布は、果粉が溶脱するおそれがあるので使用をさける。
- にんにくの種球に塗沫する場合は、処理後、風乾した後に植付けを行う。
- ハウス等で常温煙霧に使用する場合は以下の注意事項を守る。
 - ① 常温煙霧中は室内へ入らない。
 - ② 専用の常温煙霧機により所定の方法で煙霧する。特に常温煙霧装置の選定及び使用に当たっては、病害虫防除所等関係機関の指導を受ける。
 - ③ 作業はできるだけ夕刻行い、作業終了後6時間以上密閉する。できれば翌朝までそのままとし、開放後十分換気してから入室する。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意する。とくに適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

⚠ 安全使用上の注意



- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。
- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。
付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 常温煙霧中はハウス内へ入らない。また、常温煙霧終了後はハウスを開放し、十分換気した後に入室する。
- 塗沫の際は不浸透性手袋などを着用する。
- 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意を払う。

治 療 法…該当なし

魚毒性等…水産動植物（魚類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用する。

保 管…密栓し、直射日光を避け、食品と区別して、冷涼な所。

