



適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使 回 数	使用方法	タラロマイセスフ ラバスを含む農 薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	苗立枯細菌病 もみ枯細菌病 苗立枯病(トリコデルマ菌) 苗立枯病(リゾープス菌) 苗立枯病(フザリウム菌) 苗立枯病(ピシウム菌)	500倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り500mℓ	は種時	—	土壌灌注	—
		1000倍	育苗箱 (30×60×3cm、 使用土壌約5ℓ) 1箱当り1000mℓ				

作物名	使用目的	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使 回 数	使用方法	タラロマイセスフ ラバスを含む農 薬の総使用回数
稲 (箱育苗)	根の生育促進	500倍	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り500mℓ	は種時	—	土壌灌注	—
		1000倍	育苗箱 (30×60×3cm、使用土壌約5ℓ) 1箱当り1000mℓ				





効果・薬害等の注意

- 本剤の有効成分は生菌であるので、薬液調製後はできるだけ速やかに使用する。また、開封後は密封して保管し、できるだけ早く使い切る。
- 本剤は他剤と混用すると十分に効果が発揮されない場合があるので注意する。
- 本剤の所定量に少量の水を加えてかき混ぜ、その後所定量となるよう水を加え十分攪拌してから散布する。
- 使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法などを誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には病虫害防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意



- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 使用の際は農薬用マスク、不浸透性手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用する。作業後は直ちに身体を洗い流し、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさける。
- 夏期高温時の使用をさける。

治 療 法…該当なし

魚毒性等…該当なし

保 管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼・乾燥した所。

