



# ファイナルショット乳剤

農林水産省登録 第24537号

1/2

令和4年4月25日現在

## 適用及び使用方法

作物名	使用目的	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使 用 回 数	使用方法	イソプロチオラ ンを含む農薬 の総使用回数
みかん	着色促進	2000～ 3000倍	200～700ℓ/10a	収穫20～30日前	1回	立木全面散布 又は枝別散布	1回



アグロ カネショウ株式会社

<https://www.agrokanesho.co.jp/>



## ファイナルショット乳剤

農林水産省登録 第24537号

2/2

令和4年4月25日現在

### ⚠ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- アルカリ性薬剤との混用はさける。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法等を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

### ⚠ 安全使用上の注意



- 誤飲などのないよう注意する。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用する。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体质の人は取扱いに十分注意する。

治 療 法…該当なし

魚毒性等…この登録に係る使用方法では該当がない。

保 管…密栓し、火気をさけ、食品と区別して、直射日光の当たらない冷涼な所。



アグロ カネショウ株式会社

<https://www.agrokanesho.co.jp/>