



適用及び使用方法

適用農薬名	作物名	使用量 (希釈倍数)	使用方法
殺菌剤 殺虫剤	かんきつ りんご 茶類 野菜類	10mℓ/散布液10ℓ (1000倍)	添加
摘葉剤 (キノキサリン系・MEP水和剤)	りんご	5~10mℓ/散布液10ℓ (1000~2000倍)	
摘果剤 (1-ナフタレン酢酸ナトリウム水溶剤)	温州みかん		
グルホシネート グリホサートイソプロピルアミン塩 グリホサートアンモニウム塩 ジクワット・パラコート等の非選択性除草剤	非選択性除草剤の 登録内容の作物	5mℓ/散布液10ℓ (2000倍)	





効果・薬害等の注意

- 散布液 10L 当り本剤 5～10ml を加え、よくかきまぜて調製する。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布する。
- 使用に当たっては、適用農薬の使用条件や使用上の注意事項を厳守する。
- 作物の幼苗期や高温時など、一般に薬害が生じやすい条件では本剤の使用はさける。
- 適用農薬によっては、ラベルに薬害の生じやすい作物、気象条件などが記載されているので、このような場合には本剤の使用はさける。
- おうとう、ももには薬害を生じるおそれがあるので使用しない。
- 本剤の茶に対する残臭期間は前日であるので、使用は摘採前日までとする。
- 使用後、散布に用いた容器や散布器具は必ず水で十分に洗う。

安全使用上の注意

- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、散布の際は手袋、長ズボン・長袖の作業衣を着用して薬剤が皮膚に付着しないよう注意する。
付着した場合には石けんでよく洗い落とす。

治 療 法…該当なし

魚毒性等…該当なし

保 管…密栓し、火気・直射日光をさけ、食品と区別して、子供の手の届かない冷涼な所。

