



適用及び使用方法

適用農薬名	作物名	使用量(希釈倍数)	使用方法
ボルドー液	りんご	25～50mℓ/散布液10ℓ(200～400倍)	添加
	もも	17mℓ/散布液10ℓ(600倍)	
有機銅水和剤	りんご	25～50mℓ/散布液10ℓ(200～400倍)	
	麦類		
	みかん	10～17mℓ/散布液10ℓ(600～1000倍)	
	いちご	10～25mℓ/散布液10ℓ(400～1000倍)	
	アスパラガス	10mℓ/散布液10ℓ(1000倍)	
銅・有機銅水和剤	たまねぎ	25mℓ/散布液10ℓ(400倍)	
	もも	17mℓ/散布液10ℓ(600倍)	
銅水和剤	りんご	50mℓ/散布液10ℓ(200倍)	
	もも	17mℓ/散布液10ℓ(600倍)	
イミノクタジン酢酸塩液剤	麦類	50mℓ/散布液10ℓ(200倍)	
マンネブ水和剤	みかん	10～13mℓ/散布液10ℓ(800～1000倍)	
	かんきつ(みかんを除く)	10mℓ/散布液10ℓ(1000倍)	
ベンシクロン水和剤	芝	10～20mℓ/散布液10ℓ(500～1000倍)	
TPN水和剤	なし	25mℓ/散布液10ℓ(400倍)	添加(休眠期)





⚠ 効果・薬害等の注意

- 本剤は貯蔵中に分離するおそれがあるので使用の際は容器をよく振って使用する。
- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 使用に当たっては、適用農薬の使用条件や使用上の注意事項を厳守する。
- 本剤をイミノクタジン酢酸塩液剤に添加する場合、麦類の紅色雪腐病及び雪腐大粒菌核病以外には使用しない。
- 本剤を有機銅水和剤に添加してみかんに使用する場合は、温州みかんのみに使用し、中晩柑類の混植されている圃場では使用しない。
- 本剤をTPN水和剤に添加してなしに使用する場合は、二十世紀以外には使用しない。
- 使用後、散布に用いた容器や散布器具は必ず水で十分に洗う。

⚠ 安全使用上の注意

該当なし

治 療 法…該当なし

魚毒性等…該当なし

保 管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所。なお、凍結すると変質する場合があるので、極端な低温での保管はさける。

