



適用及び使用方法

適用農薬名	作物名	使用量 (希釈倍数)	使用方法
殺菌剤 殺虫剤	果樹類 野菜類 いも類 豆類(種実) 花き類・観葉植物 茶 芝	1～3.3g/散布液10ℓ (3000～10000倍)	添加
トリネキサパックエチル液剤 プロヘキサジオンカルシウム塩水和剤 MCPP液剤 アシュラム液剤	芝		
非選択性茎葉処理型除草剤	適用農薬の登録内容の作物		





効果・薬害等の注意

- 使用に当たっては、適用農薬の使用条件や使用上の注意事項を厳守する。
- キャベツ、ねぎ等のように薬液のつきにくい作物は多めに、果樹、はくさい、きゅうり、ばれいしょ等のように薬液のつきやすい作物には少なめに添加して散布する。
- 散布液を調製するときは、水に本剤を入れよく混合し、薬剤を加え、かきまぜて使用する。
- 水溶性フィルム包装の場合、内袋はぬれた手で触れない。内袋はそのまま所定量の水に投入する。外袋の開封後は使い切ることが望ましい。
やむを得ず保管する場合には、できるだけ速やかに使い切る。

安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意する。
眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受ける。
使用後は洗眼する。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意する。

治 療 法…該当なし

魚毒性等…該当なし

保 管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、小児の手の届かない冷涼・乾燥した所。
水溶性包装の場合吸湿性があるので、湿気には十分注意し、使い残りは外袋の口を固く閉じて保管する。

