



# 兼商フルーツセイバー（フロアブル）

農林水産省登録 第23133号

1/2

令和8年1月21日現在

## 適用病害と使用方法

作物名	適用病害名	希釀倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ベンチオピラドを含む農薬の総使用回数
とうとう	灰星病 褐色せん孔病 幼果園核病 炭疽病	1500倍		収穫前日まで			
なしだ	黒斑病 黒星病 赤星病 うどんこ病 褐色斑点病	1500~3000倍 1500~2000倍		収穫7日前まで			
ぶどう	灰色かび病 黒とう病 うどんこ病 褐斑病 晚腐病 さび病	1500倍		収穫7日前まで			
小粒核果類	環紋葉枯病 灰星病 すす斑病(うめ) すす点病(すもも)						
もも	黒星病 灰星病 果実赤点病 うどんこ病	1500~2000倍	200~700ℓ/10a	3回以内	散布	3回以内	
ネクタリン	黒星病 灰星病 うどんこ病						
りんご	赤星病 うどんこ病 黒星病 モニリア病 すす点病 すす斑病	1500~3000倍		収穫前日まで			
かんきつ	黒点病 灰色かび病 そうか病	1500~2000倍					
かき	灰色かび病 うどんこ病 落葉病 炭疽病 すす点病						
いちじく	さび病 灰色かび病	1500倍					
さんしょう (果実)	さび病						



アグロ カネショウ株式会社

<https://www.agrokanesho.co.jp/>



## ⚠ 効果・薬害等の注意

---

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきる。
- 使用前によく振ってから使用する。
- 薬剤耐性菌の出現を防ぐため、本剤の過度の連用はさけ、なるべく作用性の異なる薬剤との輪番で使用する。
- ぶどうの幼果期（小豆大）以降の散布は、果粉が溶脱するおそれがあるので使用をさける。
- りんごに使用する場合は、開花期までの散布で果そう葉に褐変または黄変を伴う落葉を生じるおそれがあるので注意する。
- 空容器は圃場などに放置せず、適切に処理する。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用する。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

## ⚠ 安全使用上の注意

---

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。  
眼に入った場合には直ちに水洗する。

治 療 法…該当なし

魚毒性等…該当なし

保 管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷涼な所。



アグロ カネショウ株式会社

<https://www.agrokanesho.co.jp/>