



パルミノ (フロアブル)

農林水産省登録 第23587号

1/2

令和8年5月13日現在

適用病害と使用方法

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	キノキサリン系を含む農業の総使用回数
きゅうり	うどんこ病 コナジラミ類	2000倍	100~300ℓ/10a	収穫前日まで	3回以内	散布	3回以内
なす	うどんこ病 コナジラミ類 チャノホコリダニ すすかび病						
ピーマン	うどんこ病 コナジラミ類 チャノホコリダニ						
トマト ミニトマト	うどんこ病 コナジラミ類 トマトサビダニ			5回以内	5回以内		
すいか メロン	うどんこ病			収穫3日前まで	10回以内		
かぼちゃ		収穫前日まで	3回以内	散布 無人航空機による散布	3回以内		

パルミノ/TA05-R08E



アグロ カネショウ株式会社

<https://www.agrokanesho.co.jp/>



効果・薬害等の注意

- 使用前によく振ってから使用する。
- 使用量に合わせて薬液を調製し使いきる。
- 散布液調製後はできるだけ速やかに散布する。
- ボルドー液等アルカリ性薬剤と混合すると分解が促進されるので混用はさける。
- 本剤を無人航空機による散布に使用する場合は次の注意事項を守る。
 - ①散布は散布機種種の散布基準に従って実施する。
 - ②散布に当っては散布機種種に適合した散布装置を使用する。
 - ③散布中、薬液の漏れのないように機体の散布配管その他散布装置の十分な点検を行う。
- なすに使用する場合、定植直後や幼苗、軟弱苗等には使用しない。
- コナジラミ類防除に使用する場合、発生初期の卵の多い時期が散布適期となるので、時期を失せずに散布する。
- だいず、あずきにかかると葉に薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意する。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにする。
- 空容器はほ場などに放置せず、適切に処理する。
- 本剤の使用に当たっては使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合は、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましい。

安全使用上の注意



- 誤飲などのないよう注意する。
- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意する。眼に入った場合には直ちに水洗する。
- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意する。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とす。
- 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用する。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換する。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯する。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさける。
- 夏期高温時の使用をさける。

治療法…該当なし

魚毒性等…使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきる。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さない。また空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理する。

保管…密栓し、直射日光をさけ、食品と区別して、子供の手の届かない冷涼・乾燥した所。

