



果樹専用の

BT剤

自然にやさしく、

優れた効きめの害虫防除剤

ファイブスター

顆粒水和剤



すべての果樹に収穫前日まで使えます!!



- 果樹類のハマキムシ類・ケムシ類によく効き、蜂類・天敵に害がありません。
- JAS法有機農産物生産の資材として認可されています。

りんごのミダレカクモンハマキ



■使用方法

[写真提供 青森県りんご試験場]

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BTを含む農薬の総使用回数
果樹類	ハマキムシ類	2000倍	200~700ℓ /10a	発生初期 但し、収穫 前日まで	—	散布	—
	ケムシ類	1000倍					
りんご	ハマキムシ類	1000~3000倍					
	シャクトリムシ類	2000~3000倍					
なし かんきつ	ケムシ類	2000~4000倍					
	アゲハ	1000~2000倍					
		2000倍					

平成29年8月末現在



アグロ カネショウ株式会社

東京都港区赤坂4-2-19

®は三井物産(株)の登録商標

ファイブスター[®]

顆粒水和剤

バチルス・チューリンゲンシス菌の生芽胞
および産生結晶毒素(BT) ……10.0%
毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

特長

- 授粉昆虫(蜂類など)に影響が少ないので開花時期にも使用できます。
- 害虫に有効な活性タンパク質含量が多く、高い効果が得られます。
- 溶かしやすく、扱いやすく、付着の良い顆粒水和剤です。
- JAS法の有機農産物に使用可能な資材です。また作物残留の心配のない資材です。
- 特別栽培農産物では農薬使用回数ゼロカウント扱いです。

★使用のポイント

害虫は薬剤のついた葉を食べると間もなく食害を停止します。虫が小さいほど効果が高いので若令幼虫期をねらってご使用ください。(害虫が死ぬまで2～5日位かかる場合がありますが、虫が生きていても葉や実に食害はほとんどありません。)

ファイブスター散布

りんごの
ミダレカクモンハマキ
防除の場合

2回散布をおすすめします。



⚠ 効果・薬害等の注意

- 本剤の所定量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 使用に当っては展着剤を加用することが望ましいです。
- アルカリ性の強い、石灰硫黄合剤、ボルドー液などの農薬及びアルカリ性の強い葉面施用の肥料などとの混用はさけてください。
- 本剤は若令幼虫に有効なので、若令幼虫期に時期を失せず散布してください。
- 蚕に対する毒性があるので、養蚕主要県その他主要養蚕地帯及び養蚕農家、共同飼育場などの周辺では施用しないでください。またこれら以外の場所でも付近に桑園がある場合は飛散してかからないように風向等に十分注意して散布してください。なお本剤の使用に当っては散布区域の使用規制に従ってください。
- はくさいにかかると薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合にはかからないよう十分注意して散布してください。
- 本剤は吸湿すると硬化したり、効果が低下したりすることがあるので、貯蔵に当っては湿気に注意し、特に使用残りの薬剤は密封して乾燥した冷暗所に貯蔵してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

⚠ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
 - 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
 - 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするともに衣服を交換してください。
 - 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
 - かぶれやすい体質の人は取り扱いに十分注意してください。
 - 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意してください。
- 保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別し、冷涼・乾燥した所に保管してください。

●使用前にラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。