

BT剤

虫にキビしく、

自然にやさしい

兼商

デルフィン[®]

顆粒水和剤

マイナー作物・特別栽培農産物の
強い味方です。



- JAS法の有機農産物に使用可能な資材です。また作物残留の心配のない資材です。
- 特裁農産物でもゼロカウント扱いです。



ほとんどの作物で収穫前日まで使用できます。



アグロ カネショ株式会社

東京都港区赤坂4-2-19

®はCertis USA L.L.C.の登録商標

オオタバコガ、ヨトウムシ、コナガ、ケムシ類、ハマキムシ類に

兼商 **デルフィン**® 顆粒水和剤

農林水産省登録第23884号

バチルス・チューリングエンシス菌の生芽胞

および産生結晶毒素 (BT)・・・10.0%

毒性：普通物(毒劇物に該当しないものを指している通称)

特長

● 確かな効き目

害虫が作物を食べるとすぐに効きはじめます。オオタバコガ、ヨトウムシ類、コナガ、ハマキムシ類の食害を速やかにとめ、優れた効果を発揮します。

● 溶けがよく、付着もよい

優れた付着は優れた効果の証です。デルフィン顆粒水和剤は独特の製剤技術で作られた顆粒タイプの水和剤です。溶けがよく、まんべんなく付着し、安定した効果が得られます。

● 活性タンパク質の含有量が多い

有効成分の毒素はタンパク質で構成されています。活性タンパク質の多いほど効果は高くなります。デルフィン水和剤はクルスターキー菌の中でも特に活性タンパクの種類・量が多く、従来のBT剤に比べ2倍以上の量があります。

● 天敵類に害がない

天敵類や蜂に害がなく、害虫の異常増殖(リサージェンス)の心配がありません。

■ 適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	BTを含む農薬の総使用回数					
果樹類	ハマキムシ類	2000倍	200～700ℓ/10a	発生初期但し、収穫前日まで	—	散布	—					
	ケムシ類	1000倍										
りんご	ハマキムシ類	2000～3000倍										
	シャクトリムシ類	2000～4000倍										
なし	ケムシ類	1000～2000倍										
かんきつ	アゲハ	2000倍										
オリーブ(葉)	ケムシ類	1000倍										
ブルーベリー	ハマキムシ類	2000倍										
野菜類	イラガ類	1000倍						100～300ℓ/10a	発生初期但し、収穫前日まで	—	散布	—
	オオタバコガ											
	ハスモンヨトウ											
	ウリノメイガ											
豆類(種実)	シロイチモジヨトウ	1000倍	100～300ℓ/10a	発生初期但し、収穫前日まで	—	散布	—					
	オオタバコガ											
やまのいも	ハスモンヨトウ	1000倍	100～300ℓ/10a	発生初期但し、収穫前日まで	—	散布	—					
いも類(やまのいもを除く)	オオタバコガ											
とうもろこし	オオタバコガ	1000～2000倍	200～400ℓ/10a	発生初期但し、摘採前日まで	—	散布	—					
茶	チャハマキ											
		モギエダシヤク										
たばこ	タバコアオムシ	1000～2000倍	100～180ℓ/10a	発生初期但し、収穫10日前まで	2回以内	散布	—					
	ヨトウムシ											
芝	シバツトガ	1000～2000倍	300ml/m ²	発生初期	—	散布	—					
	スジキリヨトウ											
きく	タマナヤガ	1000倍	100～300ℓ/10a	発生初期	—	散布	—					
	オオタバコガ											

平成28年12月14日現在

⚠ 効果・薬害等の注意

- 本剤の所定量を所定量の水にうすめ、よくかきまぜてから散布してください。
- 散布液調製後はそのまま放置せず、できるだけ速やかに散布してください。
- 使用に当っては展着剤を加用することが望ましいです。
- アルカリ性の強い、石灰硫黄合剤、ボルドー液などの農薬及びアルカリ性の強い葉面施用の肥料などとの混用はさけてください。
- 本剤は若令幼虫に有効なので、若令幼虫期に時期を失せず散布してください。
- 蚕に対する毒性があるので、養蚕主要県その他主要養蚕地帯及び養蚕農家、共同飼育場などの周辺では施用しないでください。またこれら以外の場所でも付近に桑園がある場合は飛散してかからないように風向等に十分注意して散布してください。なお本剤の使用に当っては散布区域の使用規制に従ってください。
- キャベツ、だいこん、ブロッコリー以外のおぼろな科野菜には薬害を生じるおそれがあるので十分注意してください。
＜薬害の確認されている作物＞はくさい、かぶ、こまつな、みずな、なばな、さいしん、ルッコラ、チンゲンサイ、タアサイ、パクチョイ
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

⚠ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。
 - 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落とすしてください。
 - 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は直ちに手足、顔などを石けんでよく洗い、洗眼・うがいをするとともに衣服を交換してください。
 - 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
 - かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。
 - 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後(少なくとも散布当日)に小児や散布に関係のない者が使用区域に立ち入らないよう縄囲いや立て札を立てるなど配慮し、人畜等に被害を及ぼさないよう注意してください。
- 保管…密封し、直射日光を避け、食品と区別し、冷涼・乾燥した場所に保管してください。吸湿すると固化したり効果が低下したりするので、湿気に注意してください。

● 使用前にラベルをよく読む ● ラベルの記載以外には使用しない ● 小児の手の届く所には置かない