

天敵、有用昆虫にやさしいダニ防除剤



カネマイト[®]フロアブル

- ハダニの卵から成虫まで優れた効果
- サビダニ、ホコリダニにも有効
- すばやく、長く効く
- 温度に影響されない



アグロ カネショウ株式会社

東京都港区赤坂4-2-19

®はアグロ カネショウ(株)の登録商標

新ラベルデザイン

カネマイト®フロアブル

■適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	アセキノシル を含む農薬の 総使用回数
かんきつ	ミカンハダニ	1000～1500倍	200～700 Ω /10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回
	チャノホコリダニ						
りんご	ミカンサビダニ	1000倍	200～700 Ω /10a	収穫前日まで	1回	散布	1回
	ナミハダニ						
なし	リンゴハダニ	1000～1500倍	200～700 Ω /10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回
	ハダニ類						
もも	ニセナシサビダニ	1000倍	200～700 Ω /10a	収穫前日まで	1回	散布	1回
	ハダニ類						
ネクタリン	ハダニ類	1000～1500倍	200～700 Ω /10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回
	モモサビダニ						
うすもめ	モモサビダニ	1000倍	200～700 Ω /10a	収穫3日前まで	1回	散布	1回
おとう	ハダニ類	1000～1500倍	200～700 Ω /10a	収穫7日前まで			
ぶどう	ハダニ類	1000～1500倍	200～700 Ω /10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回
あけび(果実)	ハダニ類	1000倍	200～700 Ω /10a	収穫3日前まで			
さんしょう(果実)	ハダニ類	1000倍	200～700 Ω /10a	収穫14日前まで	1回	散布	1回
パイパー	ハダニ類	1000倍	200～700 Ω /10a	収穫3日前まで			
マゴロン	ハダニ類	1000～1500倍	200～700 Ω /10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回
きゅうり類(漬物用)	ハダニ類	1000～1500倍	200～700 Ω /10a	収穫前日まで			
すめい	ハダニ類	1000倍	200～700 Ω /10a	収穫前日まで	1回	散布	1回
かぼち	ハダニ類	1000～1500倍	200～700 Ω /10a	収穫7日前まで			
なす	ハダニ類	1000倍	200～700 Ω /10a	収穫前日まで	1回	散布	1回
ピーマン	ハダニ類	1000倍	200～700 Ω /10a	収穫前日まで			
いちご	ハダニ類	1000～1500倍	200～700 Ω /10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回
はすいも(葉柄)	ハダニ類	1500倍	200～700 Ω /10a	収穫7日前まで			
さといも(葉柄)	ハダニ類	1000～1500倍	200～700 Ω /10a	収穫3日前まで	1回	散布	1回
やまのいも	ハダニ類	1000～1500倍	200～700 Ω /10a	収穫7日前まで			
あずき	カンザワハダニ	1500倍	200～700 Ω /10a	収穫21日前まで	2回以内	散布	2回以内
しきく(葉)	ハダニ類	1000～1500倍	200～700 Ω /10a	収穫7日前まで			
食用ぎく	ハダニ類	1000倍	200～700 Ω /10a	収穫7日前まで	1回	散布	1回
食用パンジー	ハダニ類	1000～1500倍	200～700 Ω /10a	収穫21日前まで			
食用カーネーション	カンザワハダニ	1000倍	200～400 Ω /10a	摘採7日前まで	1回	散布	1回
茶	ハダニ類	1000倍	200～400 Ω /10a	—			
花き類・観葉植物(ばら、きく、カーネーション、デルフィニウムを除く)	ハダニ類	1000～1500倍	150～300 Ω /10a	—	1回	散布	1回
きく	ハダニ類	1000～1500倍	150～300 Ω /10a	—			
カーネーション	シクラメンホコリダニ	1000倍	150～300 Ω /10a	—	1回	散布	1回
デルフィニウム	ハダニ類	1000倍	150～300 Ω /10a	—			

平成28年1月7日現在

⚠ 効果・薬害等の注意

- ボルドー液などのアルカリ性の強い薬剤との混用はさけてください。
- 本剤は植物体への浸透移行性がないので、葉の表裏にむらのないよう均一に散布してください。
- ハダニ類は繁殖が速く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期にむらのないようていねいに散布してください。
- 本剤の連続散布はハダニ類の本剤に対する抵抗性を発達させる恐れがあるので、年1回の使用とし、他の殺ダニ剤との輪番で使用してください。
- 本剤を施設栽培温州みかんに使用する場合、果実に薬害を発生させる恐れがあるので開花後の使用はさけてください。
- ぶどうに使用する場合、落花20日以降袋掛け前までの散布は果粉溶脱や汚れを生じることがあるので注意してください。
- いちごに使用する場合、新葉の葉裏に褐変症状の薬害を生じることがありますが、その後の生育に影響は認められていません。
- 周辺の作物、特にばらにかかるると薬害を生じることがあるので十分注意して散布してください。

- 散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせ調節してください。
- 散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、容器は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめ使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- アリエッティ水和剤及びアリエッティ混合剤と混用する場合、必ずカネマイトフロアブルを最初に所定の濃度に希釈してからそれぞれの剤を最後に加えてください。
- ボルドー液、石灰硫黄合剤との混用はさけてください。(効果) またボルドー液との近接散布は14日以上間隔をあけてください。

ボルドー液 14日以上 **カネマイト** 14日以上 **ボルドー液**

⚠ 安全使用上の注意

- 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体質の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触を避けてください。
- 夏期高温時の使用を避けてください。

- 魚毒性…水産動植物(甲殻類)に影響を及ぼす恐れがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。
- 保管…密栓し、食品と区別して、直射日光の当たらない冷涼な所に保管してください。特に40℃以上及び-5℃以下になる場所には保管しないでください。
- 高温になりやすい場所(車内、コンクリートの上など)に放置しないでください。

● 使用前にラベルをよく読む ● ラベルの記載以外には使用しない ● 小児の手の届く所には置かない