

予防に、よく効く、長く効く。

ダイマジン[®] 水和剤



各種病害に
高い
防除効果!



アグロ カネショウ株式会社

東京都港区赤坂4-2-19

Ⓜ 日本曹達株式会社の登録商標

ダイヤモンド[®] 水和剤

成分：イミノクタジナルベシル酸塩・・・20%
フェンヘキサミド・・・・・・・・・・30%
毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

特長

- 作用性が全く異なる二つの化合物を含む新しい病害防除剤です。
- 灰色かび病および灰星病に高い効果を示し、さらに広範囲の糸状菌に有効です。
- 優れた予防効果と長い残効性を有します。

適用病害と使用方法

※本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数の制限を示す。

作物名	適用病害名	希釈倍数	10アール当り 散布量	使用時期	総使用回数*			使用方法
					本剤のみ	イミノクタジン	フェンヘキサミド	
きゅうり	灰色かび病・うどんこ病 菌核病	1,500倍	150～300ℓ	収穫前日まで	3回以内	7回以内	3回以内	散布
トマト	灰色かび病・葉かび病							
なす	灰色かび病・すすかび病							
いちご	灰色かび病・うどんこ病	2,000倍				10回以内 (育苗期は5回以内、 本圃では5回以内)		
りんご	斑点落葉病	1,000倍				8回以内 (液剤及び水和剤は合計6回 以内(開花以降は3回以内) 塗布剤は2回以内)		
みかん	汚れ果症	1,500倍	200～700ℓ	収穫14日前 まで	2回以内	3回以内	2回以内	散布
かんきつ (みかんを除く)	灰色かび病 そうか病 汚れ果症	1,000倍						
もも	灰星病・ホモプシス腐敗病 黒星病	1,500倍						
おうとう	幼果菌核病			収穫前日まで		3回以内 (休眠期は1回以内)		
				収穫7日前まで		3回以内		

平成29年8月30日現在

△ 効果・薬害等の注意

- 使用量に合わせ薬液を調製し、使いきってください。
- 本剤はイミノクタジンを含む農薬であるので、他のイミノクタジンを含む農薬の使用回数と合わせ、作物ごとの総使用回数の範囲内で使用してください。
- ももに使用する場合、缶桃14号等の缶詰用品種では葉に薬斑を生じるので使用しないでください。
- りんごに使用する場合、芽出し2週間過ぎから落花後25日頃まではさび果を生じるおそれがあるので、この時期の使用はさけてください。
- 西洋なし品種ル レクチエではさび果を生じるので、かからないように注意してください。
- かきの品種西村早生では葉に薬斑を生じるので、かからないように注意してください。
- 本剤をおうとうに使用する場合、着色期の散布では薬害(着色障害)が生じるおそれがあるので使用しないでください。

- 幼果期のメロン、ばらに対して薬害を生じるおそれがあるので、かからないように注意してください。
- 蚕に対して毒性があるので、桑にかからないように注意して散布してください。
- 散布量は、対象作物の生育段階、栽培形態及び散布方法に合わせ調節してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特にはじめて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

△ 安全使用上の注意

- 誤飲、誤食などのないよう注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 粉末は眼に対して強い刺激性があるので、散布液調製時には保護眼鏡を着用して薬剤が眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに十分に水洗し、眼科医の手当を受けてください。
- 散布の際は保護眼鏡、農業用マスク、不浸透性手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに衣服を交換してください。

- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。

魚毒性等・・・水産動植物(藻類)に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管・・・密封し、直射日光を避け、食品と区別して、小児の手の届かない、冷涼・乾燥した所。

●使用前にはラベルをよく読んでください。●ラベルの記載以外には使用しないでください。●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。