

強カコンビの総合殺虫剤

ビリーブ

® 水和剤

野菜・果樹・茶の
害虫防除に!



アグロ カネショウ株式会社

東京都港区赤坂4-2-19

®はアグロ カネショウ(株)の登録商標です

強力コンビの **ビリーブ**® 水和剤

特異な作用で昆虫の脱皮を阻害する

IGR

ジフルベンズロン4.5%

強力な殺虫作用と忌避作用の

合ピレ

シハロトリン2.0%

特長

- 野菜・果樹・茶の重要害虫を総合的に防除できます。
- ボルドー液とも混用できます。
- IGRデミリンの作用で残効が長い。

適用害虫と使用方法

*本剤及びそれぞれの有効成分を含む農薬の総使用回数数の制限を示す。

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	総使用回数*			使用方法
					本剤	シハロトリン	ジフルベンズロン	
りんご	シンクイムシ類・ハマキムシ類 キンモンホソガ・アブラムシ類	1500倍	200~700ℓ /10a	収穫30日前まで	3回以内	3回以内	3回以内	散布
なし	シンクイムシ類 ナシチビガ・アブラムシ類				2回以内		2回以内	
みかん	ミカンハモグリガ チャノキイロアザミウマ				2回以内		2回以内	
キャベツ	アオムシ・ヨトウムシ アブラムシ類	100~300ℓ /10a	収穫7日前まで	3回以内	3回以内	3回以内		
たまねぎ	ネギアザミウマ							
らっきょう	ネギアザミウマ ネギハモグリバエ							
すいか	アブラムシ類 ミナミキイロアザミウマ	1000倍	収穫7日前まで	1回	1回	1回		
メロン								
茶	チャノコカクモンハマキ チャノホソガ チャノキイロアザミウマ	1500倍	200~400ℓ /10a	摘採21日前まで	1回	1回	1回	

平成31年2月13日現在

⚠ 効果・薬害等の注意

- 本剤のみかん及び茶での使用は場合によってハダニ類が増加することがあるので注意してください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下のことに注意してください。
 - ①ミツバチの巣箱及びその周辺にかからないようにしてください。
 - ②受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では使用をさけてください。
 - ③養蜂が行われている地区では周辺への飛散に注意する等、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 蚕に対して長期間毒性があるので、絶対に桑葉にかからないようにしてください。
- 本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、特に初めて使用する場合には、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

⚠ 安全使用上の注意

- 医薬用外劇物** 取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。
- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合には直ちに水洗し、眼科医の手当を受けてください。

- 本剤は皮膚に対して弱い刺激性があるので皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをするとともに洗眼してください。
- 本剤はのど、鼻、皮膚などを刺激する場合、また、かゆみを生じる場合があるので注意してください。
- 摘果等の作業の際は、農業用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

魚毒性等…水産動植物（魚類）に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼及び海域等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。養殖池周辺での使用はさけてください。水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管…密封し、直射日光を避け、食品と区別して、冷蔵・乾燥した所にカギをかけて保管してください。

●使用前にラベルをよく読む ●ラベルの記載以外には使用しない ●小児の手の届く所には置かない