



果樹用殺虫剤

効果がギュッと詰まった、果樹用殺虫剤


# ダースバン<sup>TM</sup> DF



つぶ太くん  
見かけによらず、  
中身の濃いヤツ。




りんご




なし




みかん



もも



## 果樹の害虫防除に、




## 中身の濃いダースバンDF。



すもも



ネクタリン



ブルーベリー



かりん



りんどう

特長

1

シンクイムシ類、ハマキムシ類、カイガラムシ類を  
同時防除。

特長

2

速効性に優れ、高い残効性と耐雨性を発揮。

特長

3

粉立ちが少なく匂いも軽減された、ドライフロアブル製剤。

特長

4

3,000倍希釈<sup>\*</sup>に濃縮された、コンパクトな省力化製剤。

<sup>\*</sup>なしのハマキムシ類、クワコナカイガラムシには3,000~4,000倍希釈、  
かんきつ、みかん(露地栽培)のカイガラムシ類、クワゴマダラヒトリは2,000倍希釈です。



サラサラの細粒~微粒



アグロ カネショウ株式会社

東京都港区赤坂4-2-19



DURSBAN/ダースバンは登録商標

# ダースバン™ DF

登録番号:第22151号  
有効成分:クロルピリホス…75.0%  
性状:淡黄色水和性細粒および微粒  
人畜毒性:医薬用外劇物  
包装:167g×40袋  
有効期限:4年

## ●適用害虫と使用方法

使用方法:散布

| 作物名              | 適用害虫名  | 希釈倍数(倍)  | 10アール当り<br>使用液量 | 使用時期                            | 使用回数*       |
|------------------|--|----------|-----------------|---------------------------------|-------------|
| りんご              | シンクイムシ類<br>ハマキムシ類<br>クワコナカイガラムシ<br>リンゴワタムシ<br>ケムシ類 | 3,000    | 200~700ℓ        | 収穫<br>45日前まで                    | 1回          |
|                  | なし   |          |                 | シンクイムシ類<br>ハマキムシ類<br>クワコナカイガラムシ | 3,000~4,000 |
| もも               | シンクイムシ類<br>ハマキムシ類<br>ウメシロカイガラムシ                    | 3,000    |                 | 収穫<br>14日前まで                    | 5回以内        |
| ネクタリン            | シンクイムシ類<br>ハマキムシ類                                  |          |                 |                                 | 2回以内        |
| すもも              | シンクイムシ類<br>ウメシロカイガラムシ                              |          |                 | 収穫<br>30日前まで                    |             |
| みかん<br>(施設栽培)    | ミカンキイロアザミウマ  | 2,000    |                 | 収穫<br>60日前まで                    | 2回以内        |
| みかん<br>(露地栽培)    | クワゴマダラヒトリ<br>カイガラムシ類                               |          |                 | 収穫<br>14日前まで                    |             |
| かんきつ<br>(みかんを除く) | カイガラムシ類  |          |                 | 3,000                           | —           |
| ブルーベリー           | ナシヒメシンクイ   | 100~300ℓ |                 |                                 | —           |
| かりん              | ナシヒメシンクイ   |          |                 | —                               | —           |
| りんどう             | リンドウホソハマキ  | —        | —               | —                               |             |

※本剤およびクロルピリホスを含む農薬の総使用回数

### ⚠ 使用上の注意事項

- 本剤の所定量に水を加え、よくかき混ぜてから散布してください。
- 蚕に対して影響があるので、周辺の桑葉にはかからないようにしてください。
- ミツバチに対して影響があるので、以下の事に注意してください。
  - ・ミツバチの巣箱およびその周辺にかからないようにしてください。
  - ・受粉促進を目的としてミツバチ等を放飼中の施設や果樹園等では、使用をさけてください。
  - ・関係機関(都道府県の農業指導部局や地域の農業団体等)に対して、周辺で養蜂が行われているか確認し、養蜂が行われている場合は関係機関へ農業使用に係る情報を提供し、ミツバチの危害防止に努めてください。
- 水源池等に本剤が飛散、流入しないよう十分に注意してください。
- 本剤の使用に当たっては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意し、とくに初めて使用する場合は病害虫防除所等関係機関の指示を受けることが望まれます。

### ⚠ 安全使用上の注意事項

- 医薬用外劇物** 取扱いには十分注意してください。誤って飲み込んだ場合には吐き出させ、直ちに医師の手当を受けさせてください。本剤使用中に身体に異常を感じた場合には直ちに医師の手当を受けてください。

●使用前にはラベルをよく読んでください。 ●ラベルの記載以外には使用しないでください。 ●本剤は小児の手の届く所には置かないでください。 ●空袋は圃場等に放置せず、適切に処理してください。洗浄水はタンクに入れてください。 ●防除日誌を記帳しましょう。

## ●ご使用の前に

所定量の水量に加え、十分にかき混ぜてから使用してください。



## ●上手な使い方

薬剤調製時は、よくかき混ぜてください。希釈液中に浮遊物等が見られる場合がありますが、散布、効果に影響はありません。

- 本剤は眼に対して弱い刺激性があるので眼に入らないよう注意してください。眼に入った場合は直ちに水洗してください。
- 散布の際は防護マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。

治療法…硫酸アトロピン製剤の投与が有効(動物実験で報告)。

魚毒性等…水産動植物(甲殻類)に強い影響を及ぼすおそれがあるので、河川、湖沼、海域及び養殖池に本剤が飛散、流入するおそれのある場所では使用しないでください。使用残りの薬液が生じないように調製を行い、使いきってください。散布器具および容器の洗浄水は、河川等に流さないでください。また、空袋等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管…密封し、直射日光をさけ、食品と区別して、冷蔵・乾燥した所にカギをかけて保管してください。盗難、紛失の際には警察に届け出てください。

製造販売

アグロ カネショウ株式会社

〒107-0052 東京都港区赤坂4-2-19  
https://www.agrokanesho.co.jp/

取扱

◎本資料は2019年11月現在の知見に基づき作成されています。