

あなたは農作物の専門医!!

殺卵効果が高いダニ剤

テデオンの乳剤



テデオンの散布で品質の良い作物を
 たくさん収穫しましょう。

テデオンはなぜ？効果が
 すぐれているのでしょうか。

- ◆テデオンのかかったダニはふ化する卵を産めなくなり、又卵にかかった場合も殺卵効果があります。
- ◆テデオンのかかった葉の上にダニが卵を産みつけた場合、ふ化することができません。
- ◆天敵・蜂類に対して影響がない。

ダニ剤は上手に使って下さい

- ダニは温度が高くなり適当な湿度があれば5～7日で卵が成虫になり成虫が30～50個の卵を産みます。自分の園は自分でよく見まわり早目にダニ剤を使いましょう。
- ダニが出始めると大発生します。ダニがふえてから散布するのは金を捨てることになります。
- ダニの成虫がふえる前に散布するのがダニ防除のヒケツです。
- 葉うらにも十分に、ていねいに散布してください。
- 薬剤の選択は計画性をもってテデオンを散布しましょう。

■適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テトラジホンを含む農薬の総使用回数	
りんご・なし	ハダニ類	500～1000倍	200～700ℓ/10a	収穫30日前まで	2回以内	散布	2回以内	
かんきつ	ミカンハダニ		100～300ℓ/10a	収穫7日前まで				
すいか	ハダニ類			収穫3日前まで				
きゅうり・なす・いちご	ハダニ類		200～400ℓ/10a	摘採30日前まで	1回			1回
茶	カンザワハダニ		100～300ℓ/10a	発生初期	10回以内			10回以内
花き類・観葉植物	ハダニ類		200～700ℓ/10a		2回以内			2回以内
すぎ	スギノハダニ							

令和2年1月現在

⚠ 効果・薬害等の注意

- ハダニ類発生前または発生初期の早期防除に使用してください。卵及びふ化幼虫が多く成虫の少ない（1葉当り1～2匹）時期に散布してください。
- メロンに対して薬害を生じるおそれがあるので、付近にある場合は、かからないように注意してください。
- そさい類などに使用する場合は濃度を濃く（500倍）使用してください。
- ハダニ類は繁殖が早いので散布はかけ残しのないようていねいに行ってください。
- 適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤を初めて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

⚠ 安全使用上の注意

- 本剤は皮膚に対して刺激性があるので、薬剤が皮膚に付着しないよう注意してください。付着した場合には直ちに石けんでよく洗い落としてください。
 - 散布の際は農薬用マスク、手袋、長ズボン・長袖の作業衣などを着用してください。作業後は手足、顔などを石けんでよく洗い、うがいをしてください。
 - 街路、公園等で使用する場合は、散布中及び散布後（少なくとも散布当日）に小児や散布に関係のない者が散布区域に立ち入らないよう縄囲いや立札を立てるなど配慮し、人畜等に被害をおよぼさないよう注意してください。
- 保管…密栓し、火気をさけ、食品と区別して、直射日光が当たらない冷涼な所。

●使用前にラベルをよく読む ●ラベルの記載以外には使用しない ●小児の手の届く所には置かない



アグロ カネショウ株式会社

東京都港区赤坂4-2-19