

コナの展着剤

# 展着パウダー30



使用カンタン  
溶けの良さ!!

特長

- 使いやすいコナの展着剤です。
- アワが少なく、消泡性能がありますので作業効率があがります。

薬剤が均等に付着し、  
クスリの皮膜を作ります。



アグロ カネショウ株式会社  
東京都港区赤坂4-2-19

コナの展着剤

# 展着パウダー30


ポリオキシエチレンヘキシタン脂肪酸エステル…… 15%  
ポリオキシエチレン脂肪酸エステル…………… 15%  
毒性：普通物（毒劇物に該当しないものを指している通称）

適用農薬名	作物名	使用量 (希釀倍数)	使用方法
殺菌剤 殺虫剤	果樹類、野菜類 いも類、豆類（種実） 花き類・観葉植物、茶、芝		
トリネキサパックエチル液剤 プロヘキサジオンカルシウム塩水和剤 MCPP液剤、アシュラム液剤	芝	1～3.3g／散布液10ℓ (3000～10000倍)	添加
非選択性茎葉処理型除草剤	適用農薬の登録内容の作物		

令和4年1月20日現在


展着パウダー30は、高性能防除機、スピードスプレーヤー(SS)の作業の効率アップに役立ち、しかも無駄がありません。

上手な  
使い方の例



10,000倍の場合

1袋



果樹(みかん、りんご、柿等)野菜類一般の作物

## △ 効果・薬害等の注意

- 使用に当っては適用農薬の使用条件や使用上の注意事項を厳守してください。
- キャベツ、ねぎ等のように薬液のつきにくい作物は多めに、果樹、はくさい、きゅうり、ばれいしょ等のように薬液のつきやすい作物には少なめに添加して散布してください。
- 敷設液を調製するときは、水に本剤を入れよく混合し、薬剤を加え、かきませて使用してください。
- 水溶性フィルム包装の場合、内袋はぬれた手で触れないでください。内袋はそのまま所定量の水に投入してください。外袋の開封後は使い切ることが望ましいです。やむを得ず保管する場合には、できるだけ速やかに使い切ってください。

## △ 安全使用上の注意

- 本剤は眼に対して刺激性があるので眼に入らないように注意してください。眼に入った場合には水洗し、眼科医の手当を受けてください。使用後は洗眼してください。
- かぶれやすい体質の人は取扱いに十分注意してください。

● 使用前にラベルをよく読む

● ラベルの記載以外には使用しない

● 小児の手の届く所には置かない

AJ22A04(Nパウ30\_1)