


天敵、有用昆虫にやさしいダニ防除剤



# カネマイト<sup>®</sup> フロアブル

- ハダニの卵から成虫まで優れた効果
- サビダニ、ホコリダニにも有効
- すばやく、長く効く
- 温度に影響されにくい



アグロ カネショウ株式会社

®は、アグロ カネショウ(株)の登録商標



詳しい製品情報はHPで  
ご確認いただけます。

# カネマイト<sup>®</sup> フロアブル

成 分：アセキノシル…………… 15%

IRAC : 20B

毒 性：—（毒劇物に該当しない）

## ■適用害虫と使用方法

作物名	適用害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使回数	使方	用法	アセキノシルを含む農薬の総使用回数
かんきつ	ミカンハダ二 ミヤノホコリダ二 ミカソビダ二	1000～1500倍  200～700L/10a	1000～1500倍  1000倍  1000～1500倍  1000倍  1000倍  1000倍  1000～1500倍  1000倍  1000～1500倍  1000倍  1000～1500倍  1000倍	収穫7日前まで	1回  散布	1回  2回以内	1回	
りんご	ナミハダ二 リソゴハダ二			収穫前日まで				
なし	ハダニ類 ニセナシサビダ二			収穫7日前まで				
もも	ハダニ類 モモサビダ二			収穫3日前まで				
ネクタリン	ハダニ類 モモサビダ二			収穫7日前まで				
マゴロ	ゴンシメ			収穫3日前まで				
すも	モモ			収穫7日前まで				
おうと	うとう			収穫14日前まで				
ぶどう	うとう			収穫3日前まで				
あけび(果実)	バヤイ			収穫30日前まで				
さんしょう(果実)	ヤ			収穫21日前まで				
ホツヅブ								
未成熟とうもろこし	ヤングコーン							
きりゅう(漬物用)	りがん							
かぼちゃ								
なす								
ピーマン	ハダニ類 チャノホコリダ二	1000倍  150～300L/10a	1000～1500倍  1000倍  1000～1500倍  1500倍  1000～1500倍	収穫前日まで	2回以内	2回以内	1回	
はすいも(葉柄)				収穫7日前まで				
さといも(葉柄)				収穫3日前まで				
やまのいも				収穫7日前まで				
食用芋	くき			収穫3日前まで				
しそ	カズワハダ二			収穫7日前まで				
きく(葉)	ハダニ類	1000倍  1000～1500倍  1000倍  1000～1500倍	200～400L/10a  150～300L/10a	収穫7日前まで	2回以内	2回以内	1回	
工ンサイ	カズワハダ二			収穫3日前まで				
食用パンジー	ハダニ類			収穫7日前まで				
食用カーネーション				摘採7日前まで				
茶	カズワハダ二	1000倍  1000～1500倍  1000倍	200～400L/10a  150～300L/10a	—	1回	1回	1回	
花き類・観葉植物 (がら、きく、カーネーション、 デルフィニウムを除く)	ハダニ類			—				
きりねーション	シクラメンホコリダ二			—				
デルフィニウム	ハダニ類	1000倍		—				

令和5年10月末現在



### 効果・葉害等の注意

- ボルドー液などのアルカリ性の強い薬剤との混用はさけてください。
- 本剤は植物体への浸透移行性がないので、葉の表裏にむらのないよう均一に散布してください。
- ハダニ類は繁殖が速く、密度が高くなると防除が困難になるので、発生初期にむらのないようていねいに散布してください。
- 本剤の連続散布はハダニ類の本剤に対する抵抗性を発達させるおそれがあるので、年1回の使用とし、他の殺ダニ剤との輪番で使用してください。
- 本剤を施設栽培温州みかんに使用する場合、果実に葉害を発現させるおそれがあるので開花後の使用はさけてください。
- ぶどうに使用する場合、落花20日以降袋掛け前までの散布は果粉溶脱や汚れを生じることがあるので注意してください。
- いちごに使用する場合、新葉の葉裏に褐変症状の葉害を生じることがあります。その後の生育に影響は認められていません。
- エンサイに使用する場合、処理葉に油浸状の葉害を生じることがあるので注意してください。



### 安全使用上の注意

- 散布の際は農薬用マスク、手袋、不浸透性防除衣などを着用するとともに保護クリームを使用してください。作業後は直ちに身体を洗い流し、うがいをするとともに衣服を交換してください。
- 作業時に着用していた衣服等は他のものとは分けて洗濯してください。
- かぶれやすい体质の人は作業に従事しないようにし、施用した作物等との接触をさけてください。
- 夏季高温時の使用をさけてください。

●周辺の作物、特にばらにかかると葉害を生じることがあるので十分注意して散布してください。

●散布量は対象作物の生育段階、栽培形態及び使用方法に合わせ調節してください。

●散布器具、容器の洗浄水及び残りの薬液は河川等に流さず、容器は環境に影響を与えないよう適切に処理してください。

●本剤の使用に当っては、使用量、使用時期、使用方法を誤らないように注意してください。特に適用作物群に属する作物又はその新品種に本剤をはじめて使用する場合は、使用者の責任において事前に薬害の有無を十分確認してから使用してください。なお、病害虫防除所等関係機関の指導を受けることが望ましいです。

●アリエッティ水和剤及びアリエッティ混合剤と混用する場合、必ずカネマイトフロアブルを最初に所定の濃度に希釈してからそれぞの剤を最後に加えてください。

●ボルドー液、石灰硫黄合剤との混用はさけてください。（効果）  
またボルドー液との近接散布は14日以上間隔をあけてください。

**ボルドー液 14日以上 カネマイト 14日以上 ボルドー液**

魚毒性…水産動植物（甲殻類）に影響を及ぼすおそれがあるので、河川、養殖池等に飛散、流入しないよう注意して使用してください。使用残りの薬液が生じないよう調製を行い、使いきってください。散布器具及び容器の洗浄水は河川等に流さず、空容器等は水産動植物に影響を与えないよう適切に処理してください。

保管…密栓し、食品と区別して、直射日光の当たらない所に保管してください。特に40℃以上及び-5℃以下になる場所には保管しないでください。

●高温になりやすい場所（車内、コンクリートの上など）に放置しないでください。

●使用前にラベルをよく読む ●ラベルの記載以外には使用しない ●小児の手の届く所には置かない