

**除草剤**  
**モゲトン粒剤**  
ACN剤

平成28年11月2日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「移植水稻」「れんこん」「くわい」「せり」の使用方法「湛水散布」に「無人ヘリコプターによる散布」を追加する。

**太字**が追加部分です。

作物名	適用雑草名	使用時期	使用量	本剤の使用回数	使用方法	ACNを含む農薬の総使用回数
移植水稻	ウキクサ類 藻類 (アオミドロ、 アミミドロ)	ウキクサ類、藻類の 発生始～発生盛期 但し、収穫45日前まで	2～3 kg/10a	3回以内	湛水散布 <b>又は</b> <b>無人ヘリコプター</b> <b>による散布</b>	3回以内
	藻類 (アオミドロ、 アミミドロ) 藻類による 表層はく離	藻類・表層はく離 の発生時 但し、収穫45日前まで	2 kg/10a		水口施用	
	藻類による 表層はく離		1～2 kg/10a			
	ウリカワ	ウリカワの増殖初期 (2～4葉期) 但し、収穫45日前まで	3～4 kg/10a			
	ヒルムシロ	ヒルムシロの 発生始～増殖始 但し、収穫45日前まで				
直播水稻	アオミドロ・ 藻類による 表層はく離	稲1葉期以降、 アオミドロ、 表層はく離発生時 但し、収穫45日前まで	1.5～2 kg/10a	3回以内	湛水散布 <b>又は</b> <b>無人ヘリコプター</b> <b>による散布</b>	3回以内
れんこん	ウキクサ類	ウキクサ類の 発生始～発生盛期 但し、収穫45日前まで	2～3 kg/10a			
くわい		ウキクサ類の 発生始～発生盛期 但し、収穫60日前まで	3 kg/10a			
せり	ウキクサ類 藻類 (アオミドロ、 アミミドロ)	ウキクサ類、藻類の 発生始～発生盛期 但し、収穫45日前まで	2～3 kg/10a	1回		1回