

殺菌剤
キノンドー顆粒水和剤
有機銅水和剤

令和元年8月28日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「おうとう」を追加。

太字が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	有機銅を含む 農薬の総使用回数
りんご	斑点落葉病 黒星病 輪紋病 褐斑病 すす点病 すす斑病 黒点病 炭疽病	1000倍	200~700 ℓ /10a	収穫14日 前まで	4回以内	散布	7回以内 (塗布は3回以内、 散布は4回以内)
なし	黒星病 黒斑病 輪紋病			収穫3日 前まで	9回以内		12回以内 (塗布は3回以内、 散布は9回以内)
おうとう	褐色せん孔病			収穫終了後 ~落葉期まで	3回以内		6回以内 (塗布は3回以内、 散布は3回以内)
かき	炭疽病 落葉病 うどんこ病			収穫14日 前まで	5回以内		8回以内 (塗布は3回以内、 散布は5回以内)
ぶどう	枝膨病 黒とう病 べと病			収穫45日 前まで	4回以内 (開花後は1回)		7回以内 (塗布は3回以内、 散布は4回以内、 (但し、開花後は 1回以内))
かんきつ (みかんを除く)	そうか病 黒点病 灰色かび病			収穫30日 前まで	3回以内		3回以内
みかん	そうか病 黒点病 灰色かび病		5回以内	5回以内			
キャベツ	黒腐病		100~300 ℓ /10a	収穫14日前まで	3回以内		3回以内
はくさい	軟腐病			収穫30日前まで	5回以内		5回以内
レタス	腐敗病 軟腐病 斑点細菌病			収穫21日 前まで			
きゅうり	べと病	収穫前日まで					