

殺菌剤
シトラーノフロアブル
有機銅・TPN水和剤

令和元年12月18日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「きゅうり」のTPNを含む農薬の総使用回数を
「10回以内(土壌灌注は2回以内、散布及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内)」から
「10回以内(土壌灌注は2回以内、散布及び常温煙霧及びくん煙及びエアゾル剤の噴射は合計8回以内)」
に変更する。

下線が変更部分です。

作物名	適用病害名	希釈 倍数	使用 液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	有機銅を含む農薬 の総使用回数	TPNを含む農薬の 総使用回数
りんご	斑点落葉病 黒点病 褐斑病 すす斑病 すす点病 輪紋病 モニリア病 炭疽病	1000倍	200～ 700L/10a	収穫45日前 まで	3回以内	散布	7回以内 (塗布は3回以内、 散布は4回以内)	3回以内
かき	落葉病 うどんこ病 炭疽病			着色期前 まで 但し、収穫30 日前まで			8回以内 (塗布は3回以内、 散布は5回以内)	
西洋なし	輪紋病 ごま色斑点病			収穫30日前 まで			12回以内 (塗布は3回以内、 散布は9回以内)	
きゅうり	褐斑病 べと病 斑点細菌病	1000～ 1200倍	100～ 300L/10a	収穫前日 まで	5回以内		5回以内	<u>10回以内</u> (土壌灌注は2回以内、 散布及び常温煙霧及び くん煙及びエアゾル剤の 噴射は合計8回以内)
キャベツ	黒腐病 べと病			収穫14日前 まで	2回以内		3回以内 (は種又は定植前の土壌 混和は1回以内、散布 及びエアゾル剤の噴射は 合計2回以内)	
はくさい	軟腐病 べと病 白斑病			収穫30日前 まで	3回以内		5回以内	3回以内 (は種又は定植前の土壌 混和は1回以内、散布は 2回以内)
レタス	すす枯病 腐敗病 べと病 軟腐病			1000倍				5回以内 (土壌灌注は2回以内、 散布は3回以内)
アスパラガス	茎枯病 斑点病 褐斑病			1000～ 1200倍				100～ 400L/10a
しょうが	白星病 紋枯病	1000倍	100～	収穫14日前 まで	5回以内		5回以内	
やまのいも	炭疽病 葉渋病	1000～ 1200倍	300L/10a	収穫30日前 まで			6回以内	