

殺虫剤
ダーズバン DF
クロルピリホス水和剤

令和2年5月27日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「かんきつ(みかんを除く)」に適用病害虫名「ミカンキイロアザミウマ」を追加する。

太字が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	クロルピリホスを含む農薬の総使用回数
りんご	シンクイムシ類 ハマキムシ類 クワコナガイガラムシ リンゴワタムシ ケムシ類	3000倍	200~700 ℓ/10a	収穫45日前まで	1回	散布	1回
なし	シンクイムシ類	3000~4000倍		収穫30日前まで	3回以内		3回以内
	ハマキムシ類 クワコナカイガラムシ						
もも	シンクイムシ類 ハマキムシ類 ウメシロカイガラムシ	3000倍		収穫14日前まで	5回以内		5回以内
ネクタリン	シンクイムシ類 ハマキムシ類			2回以内	2回以内		
すもも	シンクイムシ類 ウメシロカイガラムシ			2回以内	2回以内		
みかん (施設栽培)	ミカンキイロアザミウマ			2回以内	2回以内		
みかん (露地栽培)	クワゴマダラヒトリ カイガラムシ類	2000倍		収穫30日前まで	1回		1回
かんきつ (みかんを除く)	クワゴマダラヒトリ カイガラムシ類	2000~3000倍		収穫60日前まで	1回		1回
	ミカンキイロアザミウマ						
ブルーベリー	カイガラムシ類	3000倍	収穫14日前まで	2回以内	2回以内		
かりん	ナシヒメシンクイ						
りんどう	リンドウホソハマキ		100~300 ℓ/10a	—			

