

殺菌剤
ドウ格林水和剤
有機銅水和剤

令和2年5月27日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 使用液量欄を作成し、使用方法を「散布」に変更する。
- 作物名「芝(日本芝)」を「日本芝」、「芝(ベントグラス)」を「西洋芝(ベントグラス)」に変更し、「西洋芝(ベントグラス)」の適用病害虫名に「褐条病」を追加する。

下線が変更部分、**太字**が追加部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
<u>日本芝</u>	ヘルミントスポリウム葉枯病 カーブラリア葉枯病	250～500倍	1ℓ/m ²	発病初期	3回以内	<u>散布</u>	5回以内
<u>西洋芝</u> (<u>ベントグラス</u>)	葉腐病(ブラウンパッチ) ヘルミントスポリウム葉枯病 カーブラリア葉枯病						
	立枯病(テイクオールパッチ)	250倍					
	かさ枯病 褐条病	200倍	0.5ℓ/m ²	発病前～ 発病初期			
	紅色雪腐病 雪腐小粒菌核病	80～100倍	0.2～0.25ℓ/m ²	根雪前			
雪腐小粒菌核病	40倍	0.1ℓ/m ²					
まつ	葉ふるい病	1000倍	200～700ℓ/10a	生育期	4回以内		4回以内

作物名	適用雑草名	使用時期	希釈倍数	使用液量	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
<u>西洋芝</u> (<u>ベントグラス</u>)	藻類	藻類発生前	80～120倍	0.2～0.3ℓ/m ²	3回以内	散布	5回以内
	コケ類	コケ類発生前～生育期					