

殺虫剤
兼商ヨーバル®フロアブル
テトラニプロール水和剤

令和2年8月12日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「ねぎ」の使用法「散布」の適用病害虫名「アザミウマ類」の希釈倍数「2500倍」を「2500～5000倍」に変更。
- 作物名「ねぎ」に適用病害虫名「クロバネキノコバエ類」を追加。
- 作物名「未成熟とうもろこし」に適用病害虫名「オオタバコガ」を追加。
- 作物名「キャベツ」に適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を追加。
- 作物名「はくさい」に適用病害虫名「シロイチモジヨトウ」を追加。適用病害虫名「ネキリムシ類」を使用法「灌漑」で追加。
- 作物名「ブロッコリー」に適用病害虫名「ウワバエ類、アザミウマ類」を追加。適用病害虫名「ネキリムシ類」を使用法「灌漑」で追加。
- 作物名「なす」の使用法「散布」に適用病害虫名「ハモグリバエ類」を追加。使用法「灌漑」に適用病害虫名「オオタバコガ」を追加。
- 作物名「トマト」及び「ミニトマト」の使用法「散布」に適用病害虫名「オオタバコガ、コナジラミ類」を追加。
- 作物名「きゅうり」の使用法「散布」の適用病害虫名「アブラムシ類」の希釈倍数「2500倍」を「2500～5000倍」に変更。
- 作物名「きゅうり」に適用病害虫名「コナジラミ類」を使用法「灌漑」で追加。
- 作物名「メロン」に適用病害虫名「ウリノメイガ、アザミウマ類」を追加。適用病害虫名「ハモグリバエ類」を使用法「灌漑」で追加。
- 作物名「すいか」に適用病害虫名「オオタバコガ、ウリノメイガ、ハモグリバエ類、アザミウマ類」を追加。適用病害虫名「ハモグリバエ類」を使用法「灌漑」で追加。
- 作物名「なし」に適用病害虫名「ヒメボクトウ」を追加。
- 作物名「もも」に適用病害虫名「ハマキムシ類」を追加。
- 作物名「ぶどう」に適用病害虫名「モンキクロノメイガ、チャノキイロアザミウマ、コガネムシ類」を追加。
- 作物名「りんご」に適用病害虫名「オオタバコガ、ヨモギエダシヤク」を追加。
- 作物名「おうとう」に適用病害虫名「ケムシ類、コガネムシ類」を追加。
- 作物名「茶」に適用病害虫名「チャノミドリヒメヨコバイ、チャノキイロアザミウマ、マダラカサハラハムシ」を追加。
- 作物名「花き類・観葉植物」に適用病害虫名「オオタバコガ」を追加。

太字が追加部分、下線が変更部分です。(変更する作物のみ抜粋)

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テトラニプロールを含む農薬の総使用回数
ねぎ	ネギアザミウマ ハモグリバエ類	200倍	セル成型育苗トレイ1箱 またはペーパーポット1冊 (約30×60cm、 使用土壌約1.5～4ℓ) 当り0.5ℓ	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌漑	4回以内 (灌漑は 1回以内、 散布は 3回以内)
	シロイチモジヨトウ ネギコガ ハモグリバエ類	2500～ 5000倍					
	アザミウマ類	<u>2500～</u> <u>5000倍</u>					
	クハシコハシ 類	2500倍					
未成熟とうもろこし	アワノメイガ 材ハコ	5000倍		収穫前日 まで	3回以内	3回以内	3回以内

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テラニプロールを含む農薬の総使用回数
キャベツ	コナガ アオムシ ネキリムシ類 ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ アブラムシ類 ネギアザミウマ	200 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱 またはペーパーポット 1 冊 (約 30×60 cm、 使用土壌約 1.5～4ℓ) 当り 0.5ℓ	育苗期後半 ～定植当日	1 回	灌注	4回以内 (灌注は 1回以内、 散布は 3回以内)
	コナガ アオムシ ウバ類 ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイモリ ヨトウ オオタバコガ アブラムシ類 アザミウマ類	2500～ 5000 倍	100～300ℓ/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	
はくさい	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ アブラムシ類 ネキリムシ類	200 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱 またはペーパーポット 1 冊 (約 30×60 cm、 使用土壌約 1.5～4ℓ) 当り 0.5ℓ	育苗期後半 ～定植当日	1 回	灌注	
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ シロイモリ ヨトウ オオタバコガ アブラムシ類	2500～ 5000 倍	100～300ℓ/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	
ブロッコリー	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ハスモンヨトウ ネキリムシ類 アブラムシ類	200 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱 またはペーパーポット 1 冊 (約 30×60 cm、 使用土壌約 1.5～4ℓ) 当り 0.5ℓ	育苗期後半 ～定植当日	1 回	灌注	
	コナガ アオムシ ハイマダラノメイガ ヨトウムシ ハスモンヨトウ ウバ類 アブラムシ類	2500～ 5000 倍	100～300ℓ/10a	収穫前日 まで	3 回以内	散布	
	アザミウマ類	2500 倍					

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	テトラリアポールを含む農薬の総使用回数
なす	ハスモンヨトウ オオハコガ ハメグリバエ類 アブラムシ類 コジラミ類	200倍	25ml/株	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	4回以内 (灌注は1回 以内、散布は 3回以内)
	ハスモンヨトウ オオハコガ ハメグリバエ類 アブラムシ類	2500～5000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	
トマト ミニトマト	ハメグリバエ類 アブラムシ類 コジラミ類	200倍	25ml/株	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	
	ハスモンヨトウ オオハコガ ハメグリバエ類 アブラムシ類	2500～5000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	
	コジラミ類	2500倍					
きゅうり	ハメグリバエ類 アブラムシ類 コジラミ類	200倍	25ml/株	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	
	ハスモンヨトウ ウリメイガ ハメグリバエ類	2500～5000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日 まで	3回以内	散布	
	アブラムシ類	<u>2500～5000倍</u>					
	コジラミ類 アザミヤカ類	2500倍					
メロン	ハメグリバエ類 アブラムシ類 コジラミ類	200倍	25ml/株	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	
	ウリメイガ ハメグリバエ類 アブラムシ類	2500～5000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	
	コジラミ類 アザミヤカ類	2500倍					
すいか	アブラムシ類 コジラミ類 ハメグリバエ類	200倍	25ml/株	育苗期後半 ～定植当日	1回	灌注	
	ハスモンヨトウ オオハコガ ウリメイガ アブラムシ類 ハメグリバエ類	2500～5000倍	100～300ℓ/10a	収穫前日 まで	2回以内	散布	
	コジラミ類 アザミヤカ類	2500倍					

作物名	適用病害虫名	希釈 倍数	使用液量	使用 時期	本剤の 使用 回数	使用 方法	テラエニプロールを 含む農薬の 総使用回数
なし	ヒホクノウ ハマキムシ類 シンクイムシ類	5000～10000 倍		収穫前日 まで			
もも	ハマキムシ類 シンクイムシ類 モモハモグリガ						
ぶどう	ハマキムシ類 モキクロノメイガ チャノキイロアザミワ コガネムシ類	5000～10000 倍	200～700ℓ/10a	収穫7日 前まで	2回以内	散布	2回以内
りんご	ハマキムシ類 シンクイムシ類 ギンモンハモグリガ キンモンホソガ ヒメボクノウ オオハコガ						
	ヨモギエダシヤク			収穫前日 まで			
おうとう	ケムシ類 ハマキムシ類 オウトウショウジョウバエ コガネムシ類	5000 倍					
茶	チャノミドリヒメコバイ マダラカハラムシ	2500 倍	200～400ℓ/10a	摘採7日 前まで	1回		1回
	チャノコカクモンハマキ チャハマキ チャノホソガ ヨモギエダシヤク チャノキイロアザミワ	2500～5000 倍					
花き類・観葉植物	ハスモンヨトウ オオハコガ		100～300ℓ/10a	発生初期	3回以内		3回以内