

殺菌剤
キノドール水和剤40

有機銅水和剤

令和8年3月18日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「りんご」を削除。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数又は 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	有機銅を 含む農薬の 総使用回数
りんご	黒星病 斑点落葉病 黒点病	500～800倍	200～ 700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	7回以内 (塗布は3回以内、 散布は4回以内)

- 作物名「なし」の使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫21日前まで」に変更し、適用病害虫名「輪紋病」の希釈倍率又は使用量を「600～800倍」から「700～800倍」に変更する。

下線が変更部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数又は 使用量	使用液量	使用時期	本剤の 使用回数	使用 方法	有機銅を 含む農薬の 総使用回数
なし	黒斑病 黒星病	800～1000倍	200～ 700L/10a	<u>収穫21日前まで</u>	9回以内	散布	12回以内 (塗布は3回以内、 散布は9回以内)
	輪紋病	<u>700～800倍</u>					

<使用上の注意事項の削除>

- (4)本剤をりんごの病害防除に使用する場合は、サビ果の発生を多くすることがあるので、落花直後から落花20日頃までの使用はさけること。また樹勢の良くない状態などで連続散布すると生理落葉を助長することがあるので注意すること。特にゴールデン及びゴールデンからの育成品種では注意すること。

