

殺虫剤

アルバリン顆粒水溶剤

ジノテフラン水溶剤

平成 29 年 7 月 12 日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 「ねぎ」の適用病害虫名「アザミウマ類」の使用方法「株元灌注」の希釈倍数及び使用液量に「1000 倍」及び「1L/m²」を追加する。
- 「しょくようほおずき」、「食用ミニバラ」、「食用カーネーション」、「食用パンジー」、「食用金魚草」、「食用ぎく」の適用病害虫名に「コナジラミ類」を追加する。
- 「食用トレニア」の適用病害虫名に「アブラムシ類」を追加する。

太字が追加部分です。

作物名	適用場所	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	ジノテフランを含む農薬の総使用回数	
ねぎ	—	アザミウマ類	2000 倍	100～300L/10a	収穫 3 日前まで	2 回以内	散布	4 回以内 (は種時の土壌混和、育苗トレイへの灌注及び定植時の株元散布は合計 1 回以内、生育期の株元灌注は 1 回以内、散布及び定植後の株元散布は合計 2 回以内)	
		アザミウマ類 ハモクリバエ類 シロイモジヨトウ タネバエ ネギコガ	50 倍	セル成型育苗トレイ 1 箱またはペーパーポット 1 冊 (30×60cm・使用土壌約 1.5～4.0L) 当り 0.5L	定植前日～定植時				1 回
		クハバネキノコバエ類	1000 倍	1L/m ²	生育期 但し、収穫 14 日前まで	株元灌注			
		アザミウマ類	1000 倍	1L/m²					
		ハモクリバエ類 トビイロヒョウタンゾウムシ	400 倍	0.4L/m ²					
食用トレニア	—	アブラムシ類 コナジラミ類	3000 倍	100～300L/10a	収穫 3 日前まで	2 回以内	散布	2 回以内	
しょくようほおずき 食用ミニバラ 食用カーネーション 食用パンジー 食用金魚草		アブラムシ類 コナジラミ類							
食用ぎく									収穫 7 日前まで

