

殺菌剤  
キノドー水和剤80  
有機銅水和剤

令和8年3月18日付けで以下の通り適用拡大されました。

<変更内容>

- 作物名「りんご」を削除。
- 作物名「マルメロ」を削除。
- 作物名「かりん」を削除。
- 作物名「なし」の適用病害虫名「輪紋病」を削除。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
りんご	黒星病 斑点落葉病	1200～1600倍	200～ 700L/10a	収穫14日前まで	4回以内	散布	7回以内 (塗布は3回以内、 散布は4回以内)
	輪紋病 褐斑病 炭疽病 すす斑病 すす点病 黒点病	1200倍					
なし	輪紋病	1200倍		収穫3日前まで	9回以内		12回以内 (塗布は3回以内、 散布は9回以内)
マルメロ かりん	黒点病 ごま色斑点病	1200～2000倍	収穫14日前まで	4回以内	4回以内		
		1200倍					

- 作物名「なし」の適用病害虫名「黒星病」「黒斑病」の希釈倍率を「1200～2000倍」から「1400～2000倍」に変更し、使用時期を「収穫3日前まで」から「収穫21日前まで」に変更。

下線が変更部分です。

作物名	適用病害虫名	希釈倍数	使用液量	使用時期	本剤の使用回数	使用方法	有機銅を含む農薬の総使用回数
なし	黒星病 黒斑病	<u>1400～2000倍</u>	200～ 700L/10a	<u>収穫21日前まで</u>	9回以内	散布	12回以内 (塗布は3回以内、 散布は9回以内)

<使用上の注意事項の削除>

- (4)本剤をりんごの病害防除に使用する場合は、サビ果の発生を多くすることがあるので、落花直後から落花20日頃までの使用はさけること。また樹勢の良くない状態などで連続散布すると生理落葉を助長することがあるので注意すること。特にゴールデン及びゴールデンからの育成品種では注意すること。